

「2024.11.08」

# 农业气象周报

研究员：柳瑜萍

期货从业资格证号 F0308127

期货投资咨询 从业证书号 Z0012251

联系电话：0595-86778969

关注我们获取  
更多资讯



业务咨询  
添加客服



# 目录

---



## 1、周度重点气象



## 2、各农作物产区气象


## 「周度重点关注气象」

- ◆ 四川南部、云南大部、贵州西部等地有中到大雨，云南南部局地有暴雨，不利于油菜移栽和秋粮收晒。
- ◆ 国际方面，美豆新作收获超过九成，进入收尾阶段。下周部分地区降雨，不利于作物收获。巴西大豆播种进度加快，中西部迎来降雨，有利于播种条件改善。加拿大油菜籽收获基本技术。马来西亚和印尼产区大部分地区降雨处于正常水平。
- ◆ 10-12月拉尼娜发生概率71%。统计学模型均值显示拉尼娜现象年内发生概率上升。过往情况看，拉尼娜有一定概率会造成美国、南美大豆产量减少，棕榈油恢复生产，白糖减产。

# 「大豆周度气象分析」

## 各产区生长期

图 大豆主产区



东北地区（含内蒙古）大豆产量超总产量60%，目前大豆收获结束。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）大豆产量占总产量15%以上，目前大豆收获结束。


来源：重点农产品市场信息平台



# 「大豆周度气象分析」

## 气温——收获结束

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度	目前温度及影响
东北产区	收获结束	收获结束
黄淮海产区	收获结束	收获结束

# 「大豆周度气象分析」

## 美国大豆主产区及生长期

图 美国大豆主产区




美国大豆产区集中在中部，包括爱荷华州、伊利诺斯州、明尼苏达州、内布拉斯达州、印第安纳州等，目前大豆处于收获期。美国农业部报告显示，截至11月3日当周，美国大豆收获率94%，较五年平均进度高出9个百分点。

来源：USDA

# 「大豆周度气象分析」


## 温度、降水量——降雨高于正常水平，不利于作物收获收尾

图 未来6-10天气温前瞻



来源: CPC

图 未来6-10天降水量前瞻




来源: CPC

未来6-10天，美国多数大豆产区温度高于正常水平；降水量方面，降水高于正常水平，降雨天气对作物收获不利



## 巴西大豆主产区及生长期

图 巴西大豆主产区




巴西大豆产区集中在中西部，巴西新作大豆进入播种期。巴西国家供应公司发布的数据，截至11月3日，巴西2024/25收获期大豆播种面积达到预计面积的53.29%，高于去年同期的48.4%。

来源：USDA


## 降水量、温度——降雨增加，改善播种条件

图 巴西未来15天降水距平 (%)



来源：世界农业展望局

图3、 巴西未来15天温度距平 (°F)




来源：世界农业展望局

未来15天，巴西中西部大豆产区降雨高于正常水平；产区温度正常。降雨地区播种进度有望加快

## 阿根廷大豆主产区及生长期

图 阿根廷大豆主产区




阿根廷大豆产区集中在中部，布宜诺斯艾利斯省（31%）、科尔多瓦省（28%）、圣菲省（19%）、圣地亚哥-德尔埃斯特罗省（9%）。农业区北部的第一批土地上开始种植大豆

来源：USDA


## 降水量、温度——降雨分布不均，气温正常

图 阿根廷未来15天降水距平 (%)



来源：世界农业展望局

图3、 阿根廷未来15天温度距平 (°F)




来源：世界农业展望局

未来15天，阿根廷中部大豆产区多数地区降水分布不均；产区温度正常，大体利于播种。

# 「油菜籽周度气象分析」

## 各产区生长期

图 油菜籽主产区



西北、华北地区种植春油菜，油菜籽产量约占总产量10%，处于收获期。

长江中下游地区种植冬油菜，油菜籽产量约占总产量50%，处于出苗期。


西南地区种植冬油菜，油菜籽产量占总产量35%以上，处于出苗期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「油菜籽周度气象分析」

## 降水量——西南产区降雨，不利于油菜移栽

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
西北、华北产区 (10%，春)	收获期	条件适宜
长江中下游产区 (50%，冬)	播种至出苗期	条件适宜
西南产区 (35%，冬)	播种至出苗期	四川南部、云南大部、贵州西部等地有中到大雨，云南南部局地有暴雨，不利于油菜移栽

# 「油菜籽周度气象分析」

## 气温——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
西北、华北产区 (10%，春)	收获期	条件适宜
长江中下游产区 (50%，冬)	播种至出苗期	条件适宜
西南产区 (35%，冬)	播种至出苗期	条件适宜

# 「油菜籽月度气象分析」

## 加拿大菜籽主产区及生长期

图 加拿大菜籽主产区




加拿大菜籽集中在草原三省（阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省）种植。收获结束

来源：USDA



## 温度、降水量——收获已结束


图 未来15天降水距平 (%)



来源：世界农业展望局

阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省南部大部分地区降雨高于正常水平；阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省南部地区气温处于正常水平，曼尼托巴省南部部分地区气温高于正常水平


图 未来15天温度距平



来源：世界农业展望局

## 印度尼西亚主产区

图 印度尼西亚棕榈油主产区



印尼棕榈油主产区为苏门答腊岛和加里曼丹岛。

来源：USDA

## 马来西亚主产区

图 马来西亚棕榈油主产区




来源: MPOB

马来西亚棕榈油产区集中在沙撈越、沙巴、彭亨、柔佛、霹靂五个州，其中沙巴和沙撈越加起来产量超50%。


## 降水量——印尼和马来西亚主产区大部分降雨处于正常水平

图 东南亚未来一周降水



来源: CPC

图 东南亚未来一周降水距平




来源: CPC

马来西亚和印尼产区大部分  
地区降雨处于正常水平

# 「 棕榈油周度气象分析 」


## 厄尔尼诺&拉尼娜——10-12月拉尼娜发生概率71%

图 ENSO预测（10月）



来源：IRI

图 不同模型对ENSO指数的预测（10月）




来源：IRI

10-12月拉尼娜发生概率71%，11月至次年1月发生概率为75%。统计学模型均值显示年内拉尼娜现象发生概率上升。

# 「玉米周度气象分析」

## 各产区生长期

图 玉米主产区



东北地区（含内蒙古）种植春玉米，产量超总产量40%，处于收获期。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）种植夏玉米，产量占总产量30%以上，处于收获期。

西南地区玉米产量占总产量10%左右，目前春玉米处于收获期。

来源：重点农产品市场信息平台

## 降水量——西南产区部分地区降雨不利于秋粮收获晾晒

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区 (40%)	处于收获期	条件适宜
黄淮海产区 (30%)	处于收获期	条件适宜
西南产区 (10%)	处于收获期	四川南部、云南大部、贵州西部等地有中到大雨，云南南部局地有暴雨，不利于晾晒

# 「玉米周度气象分析」

## 气温——条件适宜

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台


产区	生长期及适合温度	目前温度及影响
东北产区 (40%)	处于收获期	条件适宜
黄淮海产区 (30%)	处于收获期	条件适宜
西南产区 (10%)	处于收获期	条件适宜



# 「棉花周度气象分析」

## 各产区生长期

图 棉花主产区



新疆棉花产量约占总产量90%，目前处于收获期。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）棉花产量占总产量6%左右，目前处于收获期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「棉花周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (90%)	收获期	条件适宜
黄淮海产区 (6%)	收获期	条件适宜

# 「棉花周度气象分析」

## 气温——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
新疆 (90%)	收获期	条件适宜
黄淮海产区 (6%)	收获期	条件适宜

## 各产区生长期

图 苹果主产区



渤海湾产区（山东、辽宁、河北、北京、天津）苹果产量约占总产量33%，目前处于收获期。


西北黄土高原区（陕西渭北地区、山西晋南和晋中、河南三门峡地区、新疆和甘肃的陇东地区）苹果产量约占总产量60%，目前处于收获期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「苹果周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源: 中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
渤海湾产区 (33%)	收获期	条件适宜
西北黄土高原 (60%)	收获期	条件适宜

# 「苹果周度气象分析」

## 气温——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
渤海湾产区 (33%)	收获期	条件适宜
西北黄土高原 (60%)	收获期	条件适宜

# 「红枣周度气象分析」

## 各产区生长期

图 红枣主产区



新疆红枣产量约占总产量50%，目前枣树处于收获期。

黄土高原区（山西、陕西）红枣产量占总产量20%以上，目前枣树处于收获期。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）红枣产量占总产量20%以上，目前枣树处于收获期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「红枣周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报



来源: 中央气象台


产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (50%)	收获期	条件适宜
黄土高原区 (20%)	收获期	条件适宜
黄淮海产区 (20%)	收获期	条件适宜



# 「红枣周度气象分析」

## 气温——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
新疆 (50%)	收获期	条件适宜
黄土高原区 (20%)	收获期	条件适宜
黄淮海产区 (20%)	收获期	条件适宜

# 「甘蔗周度气象分析」

## 各产区生长期

图 甘蔗主产区




广西、云南、广东甘蔗产量分别占总产量的68.6%、14.8%、12.6%，处于收获期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「甘蔗周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
广西 (68.6%)	收获期	条件适宜
云南 (14.8%)	收获期	条件适宜
广东 (12.6%)	收获期	条件适宜

# 「甘蔗周度气象分析」

## 气温——温度适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
广西 (68.6%)	收获期	温度适宜。
云南 (14.8%)	收获期	温度适宜。
广东 (12.6%)	收获期	温度适宜。

# 「甜菜周度气象分析」

## 各产区生长期

图 甜菜主产区



新疆甜菜产量约占总产量39%，多为春播，收获结束。


华北地区甜菜产量约占总产量57%，多为春播，收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「甜菜周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (39%)	收获结束	
华北产区 (57%)	收获结束	

# 「甜菜周度气象分析」

## 气温——收获结束

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
新疆 (39%)	收获结束	
华北产区 (57%)	收获结束	

# 「花生周度气象分析」

## 各产区生长期

图 花生主产区



东北地区花生产量约占总产量10%，目前花生收获结束。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）花生产量占总产量60%以上，目前春花生收获期结束，夏花生处于收获结束。

华南产区花生产量占总产量10%以上，目前春花生收获结束。


来源：重点农产品市场信息平台



# 「花生周度气象分析」

## 降水量——收获结束

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区 (10%)	收获结束	
黄淮海产区 (60%)	春花生收获期结束，夏花生收获结束	
华南产区 (10%)	收获结束	

# 「花生周度气象分析」

## 气温——收获结束

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
东北产区 (10%，春)	收获结束	
黄淮海产区 (60%)	春花生收获期结束，夏花生处于收获结束。	
华南产区 (10%)	收获结束	

## 各产区生长期

图 小麦主产区



西北地区小麦产量约占总产量10%以上，主要种植春小麦，目前收获结束。冬小麦处于播种至出苗期。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）小麦产量占总产量80%以上，主要种植冬小麦，处于播种至出苗期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「小麦周度气象分析」

## 降水量——适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
西北产区 (10%，春)	冬小麦处于播种至出苗期	条件适宜
黄淮海产区 (80%，冬)	冬小麦处于播种至出苗期	条件适宜

# 「小麦周度气象分析」

## 温度——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
西北产区 (10%, 春)	冬小麦处于播种至出苗期	条件适宜
黄淮海产区 (80%, 冬)	冬小麦处于播种至出苗期	条件适宜

# 「 稻谷周度气象分析 」

## 各产区生长期

图 稻谷主产区



东北地区种植粳稻，一年一季，产量约占总产量20%，收获结束。

长江中下游地区单双季稻并存，产量占总产量40%以上，早稻收获结束，晚稻处于成熟至收获期。

西南地区以单季两熟稻为主，粳、籼稻并存，产量约占总产量14%，一季稻收获结束。


华南地区种植双季籼稻，一年多熟，产量约占总产量12.5%，早稻收获期结束。晚稻处于乳熟至成熟期

来源：重点农产品市场信息平台

# 「 稻谷周度气象分析 」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北 (20%)	收获结束	
长江中下游 (40%)	早稻收获结束，晚稻处于成熟至收获期。	条件适宜
西南 (14%)	收获结束	
华南 (12.5%)	早稻收获结束。晚稻处于乳熟期至成熟	条件适宜

# 「 稻谷周度气象分析 」

## 气温——东北部分地区雨雪天气对秋收扫尾短暂不利

图 全国最高气温预报



来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
东北 (20%)	收获结束	
长江中下游 (40%)	早稻收获结束，晚稻处于成熟至收获期。	条件适宜
西南 (14%)	收获结束	
华南 (12.5%)	早稻收获结束。晚稻处于乳熟期至成熟	条件适宜



## 免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

### 瑞达期货研究院简介

瑞达期货股份有限公司创建于1993年，目前在全国设立40多家分支机构，覆盖全国主要经济地区，是国内大型全牌照期货公司之一，是目前国内拥有分支机构多、运行规范、管理先进的专业期货经营机构。2012年12月完成股份制改制工作，并于2019年9月5日成功在深圳证券交易所挂牌上市，成为深交所期货第一股、是第二家登陆A股的期货上市公司。

研究院拥有完善的报告体系，除针对客户的个性化需要提供的投资报告和套利、套保操作方案外，还有晨会纪要、品种日评、周报、月报等策略分析报告。研究院现有特色产品有短信通、套利通、市场资金追踪、持仓分析系统、投顾策略、交易诊断系统、数据管理系统以及金发服务体系专供策略产品等。在创新业务方面，积极参与创新业务的前期产品研究，为创新业务培养大量专业人员，成为公司的信息数据中心、产品策略中心和人才储备中心。

瑞达期货研究院将继往开来，向更深更广的投资领域推进，为客户的期货投资奉上贴心、专业、高效的优质服务。